





### Pré-grossissement

Mortalité\* cumulée  
**48 % (+3%)**





Croissance\* : **+6 g**  
Poids individuel = 11 (± 6,7) g




### Grossissement (huîtres collées)


Pertes\* cumulées  
**37% (+20%)** ↗



Croissance\* : **+ 9 g** ↘  
Poids individuel = 57 (± 27) g



Indice de qualité\*  
**10** ↘



\*période : juin-août 2022. Poids individuel, mortalité cumulée, indice de qualité : août 2022. Les pertes cumulées comprennent la mortalité et le décrochage des huîtres.

# Bulletin n° 6- été 2022




## Huîtres plates



### Naissain 2021


**Croissance\*** (sur cordes) : **+ 17 g**

Poids individuel = 31 (± 9) g



**Pertes cumulées**

**33%** (sur cordes)




\*période : avril-août 2022

### Naissain 2020


**Croissance :** **+ 2 g**

Poids individuel = 28 (± 12) g



**Mortalité cumulée**

**69 % (+5%)**



## Captage naturel à Thau : des résultats très encourageants !



Des collecteurs ont été mis à l'eau au mois de juin sur la table du Cépralmar à Bouzigues pour alimenter les futurs suivis en huîtres natives de Thau. Les premiers résultats sont très encourageants, le captage a été très important cette année !

Une estimation du recrutement (après détachement) sera donnée dans le prochain bulletin et les résultats de captage par les professionnels accessibles prochainement sur le site de Velyger ([www.ifremer.fr/velyger/Acces-aux-Donnees/Lagune-de-Thau](http://www.ifremer.fr/velyger/Acces-aux-Donnees/Lagune-de-Thau)).



- La mortalité estivale sur le naissain a été relativement faible (+3% de pertes par rapport au printemps). Les pertes d'huîtres sur cordes ont été plus importantes. Cela s'explique notamment par un fort taux de décrochage. Les très faibles taux d'oxygène mesurés durant l'été (en particulier sur la table localisée dans la zone de Bouzigues) semblent avoir assez peu impacté la mortalité.
- La croissance estivale a été plus modérée qu'au printemps pour le naissain et les huîtres adultes. Le taux de remplissage est également moins élevé qu'au printemps (sauf pour les huîtres triploïdes).
- Les huîtres plates collées sur corde ont présenté une meilleure croissance que celles en casiers australiens sur la période avril-août 2022. Des fortes mortalités ont à nouveau été constatées chez les huîtres plates sur cordes sur la zone de Mèze (50 % de pertes) contrairement à Marseillan où la mortalité a été plus limitée.