






Pré-grossissement : bilan avant collage

Mortalité* cumulée finale
48 % (+0)



Collage des huîtres creuses :
mi-octobre 2022
Poids individuel moyen =
20,5 ± 13,7 g
Densité : 30 huîtres/mètre



Grossissement (huîtres collées) : bilan



Pertes* cumulées finales
40% (+3) ↗

Poids individuel final* : **68 ± 33 g**

Indice de qualité final*
11 ↗



*période : Bilans : septembre-octobre 2022. Les pertes cumulées comprennent la mortalité et le décrochage des huîtres.

Bulletin n° 7- automne 2022




Huîtres plates



Naissain 2021

Pertes* cumulées : **37 % (+4)**
(sur cordes)




Mise à l'eau des naissains 2022 en en lanternes et pearl nets : septembre 2022
PM = 0,4 g


*période : septembre-novembre 2022. Mortalité, pertes cumulées, poids individuel : novembre 2022

Naissain 2022

Croissance* : **+ 3 g**
Poids individuel = 3,3 (± 1,8) g



Mortalité* cumulée **39 %**



Captage naturel à Thau : bilan du captage 2022



Le captage a été un succès cette année ! Les collecteurs ont été détriqués fin septembre 2022. Les résultats obtenus sont les suivants :

- **Nombre estimé d'individus par coupelle après détriquage :**
 - 16,5 individus/coupelle (table Cépralmar Bouzigues)
 - 62 individus/coupelle (table du Lycée de la mer) (attention : présence de balanes)
- **Poids individuel moyen (table Cépralmar) : 10,5 g**
- **Taille moyenne (table Cépralmar) : 46 mm**

Les naissains captés sur la table du Cépralmar étaient d'une taille suffisante pour être collés en octobre 2022.



- Les huîtres sur cordes ont été détriquées fin septembre 2022. Les pertes cumulées lors de la phase de grossissement sur cordes s'élèvent à **40 %**. Une partie non négligeable de ces pertes est due au décrochage des huîtres. **Les pertes les plus importantes ont été observées pour les huîtres triploïdes sur la zone de Bouzigues et les plus faibles avec les huîtres naturelles de Thau, toutes zones confondues (< 20%).**
- Le naissain 2022 a été collé mi-octobre. La mortalité cumulée à l'issue du pré-grossissement en pearl-nets sur la période avril-octobre 2022 se situe autour de **50 %** (contre 27 % sur la même période en 2021).
- Les collecteurs mis à l'eau sur les tables du Cépralmar à Bouzigues et du Lycée de la mer au mois de juin 2022 ont été détriqués fin septembre. Les quantités de naissains obtenues après détriquage ont été estimées à entre 16,5 et 62 individus par coupelle.